



RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Paracox 8, suspensión para preparación de suspensión oral para pollos

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada dosis de 0,1 ml de vacuna contiene:

Sustancias activas:

<i>Eimeria acervulina</i> HP	500 ooquistes
<i>Eimeria brunetti</i> HP	100 ooquistes
<i>Eimeria maxima</i> MFP	100 ooquistes
<i>Eimeria maxima</i> CP	200 ooquistes
<i>Eimeria mitis</i> HP	1000 ooquistes
<i>Eimeria necatrix</i> HP	500 ooquistes
<i>Eimeria praecox</i> HP	100 ooquistes
<i>Eimeria tenella</i> HP	500 ooquistes

Disolvente para nebulización en pollos

Excipientes:

Acido carmínico (Colorante rojo E120)
Goma xantana (E415)

Para la lista completa de excipientes, véase la sección 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión para preparación de suspensión oral

Vacuna: suspensión acuosa.

Disolvente para nebulización en pollos: solución semi-opaca, roja, viscosa.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Especies de destino

Pollos.

4.2 Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Administración en agua de bebida:

En aves de 5 a 9 días de edad, con una vida prevista superior a 10 semanas (reproductoras, ponedoras, pollos de engorde,...):



Para la inmunización activa frente a la coccidiosis producida por *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. praecox* y *E. tenella*

Administración por nebulización sobre los pollos:

Para la inmunización activa de pollos frente a la coccidiosis producida por *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. praecox* y *E. tenella*:

- para reducir la infección (excreción de ooquistes), con un establecimiento de inmunidad de 21 días para todas las cepas excepto *E. mitis*.
- para reducir la pérdida de peso, con un establecimiento de inmunidad de 21 días para todas las cepas excepto *E. máxima*.

Duración de la inmunidad: al menos 10 semanas para todas las cepas.

4.3 Contraindicaciones

Ninguna.

4.4 Advertencias especiales para cada especie de destino

Vacunar únicamente animales sanos.

4.5 Precauciones especiales de uso

Precauciones especiales para su uso en animales

El agua y el pienso suministrados a los pollos antes, durante y después de la vacunación, deben estar libres de agentes anticoccidiósicos o con actividad anticoccidiósica.

Asegurarse de que todo el equipo de vacunación se limpie a fondo antes de su utilización, de acuerdo con las prácticas de higiene habituales en avicultura: desmontaje, limpieza y desinfección de jeringas y bebederos, finalizando con un lavado con agua potable. No usar en bebederos secos.

Los animales deben estar sanos y criados en suelo (en yacija). Para asegurar la inmunidad a largo plazo, es necesario que la inmunidad producida por el medicamento se vea reforzada por el contacto natural de las aves con los coccidios en su entorno. La ingesta de pienso con actividad anticoccidiósica, en cualquier momento después de la vacunación, puede acortar la duración de la inmunidad. Esto es especialmente importante durante las 4 semanas siguientes a la vacunación.

Una limpieza cuidadosa de las instalaciones entre cada ciclo de cría reduce el número de coccidios que persisten en las zonas y reduce el riesgo de coccidiosis temprana anterior al desarrollo de inmunidad.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales

Administración en agua de bebida:

Retirar el agua de bebida 1-2 horas antes de la vacunación para que las aves tengan sed.

Agitar enérgicamente el envase de vacuna para homogeneizarlo antes de su uso

El medicamento contiene goma xantana, que facilita la suspensión de los ooquistes en el agua.



La vacuna no debe ser administrada en tanques grandes (al final de la instalación, por ejemplo). Debe ser administrada directamente en los propios bebederos o a través de una jeringa automática.

Administración por nebulización sobre los pollos:

Para la administración por nebulización sobre los pollos, la vacuna debe ser diluida con el “Disolvente para nebulización en pollos”.

4.6 Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

No se han descrito.

4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta

No aplicable.

4.8 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

La inmunidad a la infección por coccidios tras la administración de Paracox 8 se obtiene por vía natural. Debe destacarse que la administración de cualquier medicamento con actividad anticoccidiósica (incluyendo ciertos antibacterianos) en el agua o en el pienso, durante la vacunación, puede reducir el periodo de inmunidad efectiva.

No existe información disponible sobre la seguridad y la eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro medicamento veterinario. La decisión sobre el uso de esta vacuna antes o después de la administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

4.9 Posología y vía de administración

Para administración oral en pollos, a partir de 1 día de edad mediante nebulización sobre los pollos o entre los 5-9 días de edad en agua de bebida

Administración en agua de bebida

Administrar una sola dosis de 0,1 ml por pollo en el agua de bebida.

Pauta de vacunación:

Diluir la vacuna a una concentración de 1 dosis/2-4 ml en agua fría del grifo. Calcular el número medio de aves por lineal de bebida y calcular el volumen de vacuna diluida necesaria por lineal de bebida a una proporción de 2-4 ml por ave.

Llenar cada lineal con vacuna diluida y bajarlos para permitir a las aves acceso a las tetinas. Una carga inicial (alrededor de 1 litro) de un indicador (ejem. leche) puede utilizarse para mostrar cuándo se ha llenado el lineal hasta el final y puede cerrarse, sin malgastar vacuna. Según beban las aves, mantener cada lineal lleno a través de su depósito de cabecera hasta que toda la vacuna diluida preparada para ese lineal se haya añadido. Continuar entonces con el suministro normal de agua.

Se recomienda que antes de utilizar la vacuna en una instalación por primera vez se tomen precauciones para comprobar que el procedimiento asegura que los lineales de bebederos han



sido llenados adecuadamente con Paracox 8, como muestra el aspecto del indicador de las tetinas al final del lineal, antes de que se permita a los pollos empezar a beber.

Bebedores de campana:

Elevar los bebederos 1-2 horas antes de la vacunación; no dejarlos sin agua. Introducir el volumen apropiado de vacuna en cada bebedero y bajarlo inmediatamente. El sistema de agua deberá conectarse para permitir que los bebederos se rellenen automáticamente.

Bebedores de minicopa (mini-cup):

Como en el caso anterior, inoculando en cada copa.

Bebedores de cubeta:

Secarlos 1-2 horas antes de la vacunación. Llenarlos inmediatamente antes de la inoculación con la cantidad de vacuna apropiada.

Bebedores tipo fuente llenados a mano:

Retirarlos 1-2 horas antes de la vacunación. Asegurarse de que estén llenos antes de la inoculación con la cantidad apropiada de vacuna, y colocarlos de nuevo en el gallinero.

Bebedores suplementarios llenados a mano:

Retirarlos 1-2 horas antes de la vacunación. Hacer una dilución de la vacuna en un recipiente adecuado (por ejemplo, un cubo de agua) e incorporar la vacuna diluida en cada bebedero. La dilución no debe ser superior a 1/50 (100 o 500 ml, en 5 o 25 litros de agua).

Nota: En los casos en los que se utilicen bebederos de tubo u otros bebederos no adecuados para medicación directa, deberán sustituirse por aquellos indicados para la administración de la vacuna. No añadir la vacuna al tanque general de agua.

Administración por nebulización

La vacuna debe ser repartida utilizando un volumen de dosis de 0,21 ml de vacuna diluida por ave, usando un spray de gota gruesa. Determinar la capacidad de reparto del equipo de nebulización en términos del volumen repartido por 100 aves. Multiplicar este volumen por 50 para obtener el volumen total de vacuna diluida requerida para 5000 dosis (o por 10 para 1000 dosis), es decir, para la preparación de 5000 dosis de vacuna diluida, se requiere un total de $0,21 \times 5000 = 1050$ ml de vacuna diluida, que se distribuyen entre vacuna, disolvente y agua como se indica a continuación:

1. 500 ml de vacuna Paracox 8 (1 envase)
2. 500 ml de disolvente (1 vial)
3. Rellenar hasta 1050 ml con agua

El disolvente contiene un agente colorante rojo y goma xantana, ambos para una mejor ingesta de la vacuna.

El agua utilizada para la dilución de la vacuna debe ser potable, fresca y libre de contaminación. Tomar un recipiente limpio para la preparación de la vacuna, añadir al recipiente el disolvente y la cantidad de agua calculada y mezclar ambos hasta obtener una solución uniforme. Agitar y presionar el envase de Paracox 8 de 5000 dosis (o 1000 dosis) enérgicamente durante 30 segundos para asegurar la resuspensión de los ooquistes. Añadir el contenido total del envase de Paracox en el recipiente con el agua y el disolvente y mezclar bien. Añadir la vacuna diluida al reservorio del nebulizador y pulverizar uniformemente sobre las aves utilizando un spray de gota gruesa. Asegurarse de una cobertura controlada, uniforme, de la total superficie interna de la caja que contiene los pollos. Dejar a las aves en la caja



durante al menos 30 minutos en un área bien iluminada para dar tiempo a las aves para que se chupen.

Normas de empleo para la utilización del envase

No es necesario el empleo de agujas ni objetos punzantes para abrir el envase plástico.

El contenido permanecerá estéril y no podrá ser manipulado hasta su apertura con el dispositivo especial de dosificación.

El envase está dotado de una cinta para colgar del cinturón o del cuello del manipulador.

El envase contiene una cantidad extra de vacuna suficiente para realizar el cebado del tubo.

4.10 Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos), en caso necesario

Una sobredosificación severa (x 5 o más) puede conducir a una reducción temporal en la ganancia de peso vivo.

4.11 Tiempo de espera

Cero días.

5. PROPIEDADES INMUNOLÓGICAS

Grupo farmacoterapéutico: Inmunológicos para aves, aves domésticas, vacunas parasitarias vivas, coccidios.

Código ATCvet: QI01AN01.

Para la inmunización activa de pollos frente a la coccidiosis producida por distintas especies del género *Eimeria* (ver apartado 2. Composición cualitativa y cuantitativa).

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Paracox 8:

Goma xantana (E415).

Agua purificada.

Disolvente para nebulización en pollos:

Acido carmínico (Colorante rojo E120)

Cloruro de sodio

Goma xantana (E415)

Agua para preparaciones inyectables

6.2 Incompatibilidades principales

No mezclar con ningún otro medicamento veterinario, excepto el disolvente suministrado para su uso para la administración por nebulización en pollos.

6.3 Período de validez

Paracox 8:

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 28 semanas.

Período de validez después de abierto/diluido el envase primario: 4 horas.

Disolvente para nebulización en pollos:

Período de validez acondicionado para su venta: 2 años.

6.4. Precauciones especiales de conservación

Paracox 8:

Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C).

No congelar.

Proteger de la luz.

Disolvente para nebulización en pollos:

Conservar entre 2-25 °C.

6.5 Naturaleza y composición del envase primario

Paracox 8:

Bolsa multidosis de polietileno calidad alimentaria, con capacidad nominal de 100 ml y 500 ml, con etiqueta interior, etiqueta exterior (caja) y prospecto. Tubo dosificador.

Disolvente para nebulización en pollos:

Viales de plástico PET cerrados con un tapón de goma y sellados con una cápsula de aluminio.

Para la administración por nebulización en pollos, la suspensión se suministra junto con el volumen de disolvente adecuado (100 ml de disolvente para 1000 dosis; 500 ml de disolvente para 5000 dosis).

Formatos para administración en agua de bebida

Caja con 1 bolsa de 100 ml (1000 dosis) y tubo dosificador.

Caja con 1 bolsa de 500 ml (5000 dosis) y tubo dosificador.

Formatos para administración por nebulización en pollos

1 vial de disolvente de 100 ml + Caja con 1 bolsa de 100 ml (1000 dosis).

1 vial de disolvente de 500 ml + Caja con 1 bolsa de 500 ml (5000 dosis).

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

6.6 Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.
Polígono Industrial El Montalvo I
C/ Zeppelin, nº 6, parcela 38
37008 Carbajosa de la Sagrada
Salamanca

8. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1660 ESP

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

Fecha de la primera autorización: 31 de octubre de 2005.
Fecha de la última renovación: 05 de julio de 2010.

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO

Junio 2018.

PROHIBICIÓN DE VENTA, DISPENSACIÓN Y/O USO

Condiciones de dispensación: Medicamento sujeto a prescripción veterinaria

Condiciones de administración: Administración bajo control o supervisión del veterinario